

## 園芸技術情報 ～ ブロッコリー ～

令和5年7月20日

胆振農業改良普及センター本所  
電話：0142-23-3195



普及センターHP

# 「黒すす病」の防除について

◎8月中旬以降に収穫する作型では「黒すす病」の防除が必須となります。

◎2回防除で高い防除効果が得られます。

1回目…「定植30日後」＝葉から花蕾への伝染源を減らす

2回目…「花蕾形成始頃」＝花蕾への感染予防



ブロッコリーの3～4割が出蕾した状態

「黒すす病」に効果が認められている薬剤

薬剤名	系統	希釈倍数	使用時期	使用回数
アフエット フロアブル	SDHI	2,000倍	収穫前日まで	3回以内
パレード20 フロアブル	SDHI	2,000～ 4,000倍	収穫前日まで	3回以内
アミスター20 フロアブル	QoI	2,000倍	収穫3日前まで	3回以内
シグナムWDG	SDHI QoI	1,500倍	収穫7日前まで	2回以内

いずれの薬剤も使用液量は10aあたり100～300ℓ

※「シグナムWDG」は『はなやさい類』で作物登録があります。

◎収穫後の残さは速やかにすき込みましょう。



残さを放置しておくと、収穫中や収穫前の隣接ほ場への伝染源となります。

～農薬散布は、希釈倍数・時期・回数に注意しながら行いましょう～